



VEERA NISKANEN

HYVINVOINTI ♦ LÄÄKÄRI ♦ ESTETIIKKA

veeraniskanen.fi

Hyaluronidaasi-hoidon jälkeen

Hyaluronidaasi-entsyymi voi aiheuttaa erittäin harvinaisissa tapauksissa anafylaktisen sokin, eli vakavan allergisen reaktion. Kyseessä on hengenvaarallinen tila, jonka oireina voi esiintyä voimakasta hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa, yskää, nielemisvaikeutta, silmäluomien ja / tai kielen turpoamista, äänen käheyttä, vatsakipua, pahoinvointia tai ripulia.

Näissä oireissa on heti hakeuduttava lähimpään päivystykseen tai soitettava 112.

Täyteaineen poiston jälkeen normaaleina jälkioireina voi esiintyä punoitusta, turvotusta, kutinaa, mustelmia tai arkuutta hoidetulle alueelle. Oireet ovat yleensä lieviä, ja normaalisti häviävät itsekseen muutamassa päivässä hoidon jälkeen mustelmia lukuun ottamatta.

Hoidon tulokset voivat olla lähes välittömästi nähtävissä, mutta lopullista tulosta voidaan arvioida vasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua. Täydellistä poistotulosta ei voida taata, sillä kyseessä on entsyymi, jonka käyttäytymiseen vaikuttavat mm. yksilöllinen aineenvaihdunta, täyteaineen sijainti sekä ulkoiset tekijät ja tietyt lääkeaineet (mm. tulehduskipulääkkeet ja antihistamiinit voivat heikentää hoidon tehoa). Hyaluronidaasi hajottaa myös ihon luonnollista hyaluronihappoa, ja hoidettu alue voi vaikuttaa veltolta tai tyhjältä hoidon jälkeen tästä johtuen jonkin aikaa.

Tarvittaessa hoidon voi uusia vähintään 2 viikon kuluttua lisämaksusta.

Käsikauppalääkkeiden käyttöä hoitoa ennen ja sen jälkeen ei suositella ilman hoidon antajan konsultaatiota. Alueen hoitamista kylmällä pitkiä aikoja ei suositella. Hoidettua aluetta voi kevyesti hieroa lääkärin ohjeiden mukaisesti kotona 3-4 kertaa päivässä.

Olethan yhteydessä puhelimitse tai tekstiviestillä, jos sinulle tulee kysyttävää hoidosta.

Lääkäri Veera Niskanen p. 044 311 4372